



# DZIAŁANIE

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE Z LUB BEZ PERISOLV<sup>3</sup>


PRZED



PO



# PROSTA APLIKACJA W 6 KROKACH



 **PERISOLV**  
5 x 0.6 ml strzykawka

## LITERATURA

1. Gottardi W et al. N-Chlorotaurine, a natural antiseptic with outstanding tolerability. J Antimicrob Chemother. 2010; 65:399-409.
2. Gottardi W et al. 'N-Chloramines, a Promising Class of Well-Tolerated Topical Anti- Infectives Antimicrobial. Agents and Chemotherapy. 2013; 57(3):1107-1114.
3. Jurczyk K et al. In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteria associated with periodontitis. Clin Oral Invest. 2016; DOI 10.1007/s00784-016-1711-9.
4. Bach G et al. Grundsätzliche Gedanken zum Einsatz eines antimikrobiellen Gels im Rahmen der Therapie einer Periimplantitis. Dent Implantol. 2016;20, 3, 150 – 159.

PERISOLV® jest produkowany przez RLS Global AB, Sörredsbacken 20, SE-41878 Göteborg.

LIBERDENT Sp. z o.o.  
ul. M. Raciborskiego 6/2 | 31-463 Kraków  
Tel. +48 795 339 140  
office@liberdent.pl | www.liberdent.pl


 **REGE DENT**  
smart regeneration



# PERISOLV

## CZERWONA KARTKA DLA BIOFILMU

ELIMINACJA BIOFILMU JEST KLUCZOWA  
W SKUTECZNYM LECZENIU CHOROÓB PRZYZĘBIA,  
STANÓW ZAPALNYCH BŁONY ŚLUZOWEJ  
WOKÓŁ IMPLANTÓW ORAZ PERI-IMPLANTITIS.



 **Liberdent**

# NOWA APLIKACJA


DLA LECZENIA STANÓW ZAPALNYCH TKANEK WOKÓŁ ZĘBÓW I IMPLANTÓW

Periodontitis, zapalenie błony śluzowej wokół implantu i peri-implantitis to infekcje bakteryjne o podobnych objawach. Podstawową przyczyną wszystkich trzech stanów, które rozwijają się w podobny sposób, jest biofilm bogaty w patogenne bakterie. Zmiękczenie biofilmu i skuteczne eliminowanie bakterii jest zatem kluczowym warunkiem skutecznego leczenia.

PERISOLV® to preparat na bazie chloramin, który skutecznie eliminuje bakterie i może być z powodzeniem stosowany wraz z mechanicznym oczyszczaniem.

## ZALETY PERISOLV®

- ✓ PRZENIKA I ZMIĘKCZA BIOFILM
- ✓ SKUTECZNIE ELIMINUJE BAKTERIE
- ✓ REDUKUJE GŁĘBOKOŚĆ KIESZONEK



# LECZENIE STANU ZAPALNEGO WOKÓŁ IMPLANTU

Prof. Vincenzo Iorio-Siciliano, University of Catanzaro, Włochy



Badaniem sondą (gł. kieszonki≤5 mm), krwawienie podczas badania.



Aplikacja PERISOLV® przed leczeniem niechirurgicznym.



Usunięcie biofilmu za pomocą skalera sonicznego z końcówką PEEK.



Badanie sondą po 6 miesiącach.

# LECZENIE FURKACJI

Prof. Vincenzo Iorio-Siciliano, University of Catanzaro, Włochy



1. Gł. kieszonki 5 mm.



2. II klasa furkacji.



3. Pierwsza aplikacja preparatu PERISOLV®.




4. Skaling wykonany za pomocą ultradźwięków.



5. Druga aplikacja preparatu PERISOLV®.



6. Wykonanie zabiegu root planing.



7. Gł. kieszonki 3 mm.



8. I klasa furkacji bez śladów bakterii (brak krwawienia podczas badania).